

의심환자 안내문



회복 및 치료

- 지카바이러스 감염증은 대부분 충분한 휴식을 통해 일주일 이내 회복됩니다.
- 발열 또는 통증이 지속되는 경우 의사의 처방에 따라 약물을 복용할 수 있습니다.
- 필요에 따라 진통제, 해열제 복용이 가능하나, 복용할 경우 Dengue열이 아님을 확인한 후 복용해 주세요.
- 확진 검사는 진료의사의 판단에 따라 의뢰 가능하며, 검사결과는 보건소를 통해 통보 예정입니다.



격리 관련

- 지카바이러스 감염증은 일상적인 접촉으로 감염되지 않기 때문에 확진되더라도 격리치료는 불필요합니다.
- 증상 치료를 위해 입원이 필요한 경우가 아니면 자택에서 평소와 같이 생활하시고 직장에서 업무를 보셔도 됩니다.
- 다만 모기를 통해 주변 사람들에게 전파될 가능성이 있기 때문에 모기 활동 시기에는 증상이 나타난 후 1주일 동안 모기에 물리는 것을 피해야 합니다.

기타 주의사항

- 감염되고 회복된 이후에는 1개월 간 헌혈을 하지 말아야 합니다.
- 성 접촉을 통해 감염될 가능성도 낮지만 제기되고 있어 감염된 남성의 경우 회복되고 6개월 간 콘돔을 사용할 것을 권고합니다.

지카바이러스 감염이 의심되는 경우나 기타 궁금한 사항이 있을 때는 질병관리본부 콜센터(국번없이 109) 또는 보건소로 연락주세요



보건복지부



질병관리본부